

Heidrun Gehlen, Claudia Simon, Birgitta Reinhold-Fritzen, Antina Lübke-Becker,
 Anne Kauter, Birgit Walther, Christiane Cuny, Robin Köck Uwe Rösler



TABELLE 1: Beispiele für Hygienemaßnahmen, Desinfektion und Schutzausrüstung bei häufigen übertragbaren Infektionserregern des Pferdes

Erreger	Krankheit	Transmission	Räumliche Unterbringung	Persönliche Schutzausrüstung	Dauer der Maßnahmen	Bemerkungen
Methicillin-resistente <i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA)	Infektion mit multiresistenten Infektionserregern	direkt, indirekt	Isolierung	Einmalhandschuhe Schutzkittel evtl. Schutzmaske	solange die Infektion andauert	Handhygiene und Schlussdesinfektion mit bakteriziden Mitteln
Extended-Spektrum beta-Laktamase-produzierende (ESBL) <i>Enterobacteriaceae</i> spp.	Infektion mit multiresistenten Infektionserregern	direkt, indirekt	Isolierung	Einmalhandschuhe Schutzkittel Evtl. Schutzmaske	solange die Infektion andauert	Handhygiene und Schlussdesinfektion mit bakteriziden Mitteln
<i>Salmonella</i> spp.	Salmonellose	direkt, indirekt	Isolierung	Einmalhandschuhe Schutzkittel Überziehschuhe	gesamter Klinikaufenthalt meldepflichtig	Handhygiene und Schlussdesinfektion mit bakteriziden Mitteln
<i>Clostridioides</i>	Enteritis/Colitis	direkt	Isolierung	Einmalhandschuhe Schutzkittel	Dauer der Symptome + mindestens 48 h	Handhygiene und Schlussdesinfektion mit sporiziden Mitteln