



Die Lungenscore-Befunde von Schlachtschweinen sind mit dem Impfstatus gegen *Mycoplasma hyopneumoniae* und PCV2 assoziiert

Association of lung score findings from slaughter pigs with their vaccination status against Mycoplasma hyopneumoniae and PCV2

Wolfgang Sipos, Branimir Dobrokes, Laurianne Meppiel, Judith Sailer, Ursula Friedmann, Vojislav Cvjetković

TAB. 3: Odds-Ratios (OR; Impfung Ja vs. Nein) sowie Konfidenzintervalle in Abhängigkeit vom *M. hyopneumoniae*- und PCV2-Impfstatus

Parameter	OR	Untere Grenze	Obere Grenze	P-Wert
Dorsokaudale Pleuritis	0,298	0,196	0,454	< 0,0001
Kraniale Pleuritis	0,719	0,518	0,999	0,0491
Bronchopneumonie	0,358	0,215	0,596	< 0,0001
m. B. vs. k. B.	2,684	1,748	4,123	< 0,0001
g. B. vs. k. B.	1,119	0,687	1,823	0,6526
s. B. vs. k. B.	0,812	0,509	1,294	0,3812
SPES	0,238	0,172	0,329	< 0,0001
EP-Index	0,358	0,215	0,596	< 0,0001
m. B. vs. k. B.	2,684	1,748	4,125	< 0,0001
g. B. vs. k. B.	1,119	0,687	1,824	0,6526
s. B. vs. k. B.	0,812	0,509	1,295	0,3812

k. B.: kleine Bestände, m. B.: mittelgroße Bestände, g. B.: große Bestände, s. B.: sehr große Bestände