

# Der Praktische Tierarzt

**Tab. 5: Experimentell und empirisch ermittelte Dosierungen aus der Literatur (Kölle und Blahak 2016, Kowalewski 2018, Sladky und Mans 2019). Hinweis: Die gesetzlichen Bestimmungen zur Umwidmung von Arzneimitteln sind einzuhalten.**

	Dosierung mg/kg	Besondere Hinweise
<b>Opioide</b>		
Hydromorphon	0,5–1	WSK
Morphin	1,0–10,0	WSK, Bartagamen, Tegus, Grüne Leguane
Tramadol	5,0–10,0–25,0	SK, Bartagamen, Königspythons (bei WSK Applikation Hintergliedmaße sinnvoll)
Buprenorphin	0,01–0,2	Wirkung unklar
Butorphanol	0,2–2	Wirkung unklar
Methadon	3–5	WSK
<b>NSAIDs</b>		
Carprofen	1,0–4,0	
Ketoprofen	2,0	Wirkung bei Echsen und SK, bei Schlangen unklar
Meloxicam	0,1–0,5	
Flunixin-Meglumin	0,1–2,0	
<b>Lokalanästhetika</b>	Bis 4	Toxische Effekte bei WSK über 4

WSK = Wasserschildkröte; SK = Schildkröten gesamt