

Tab. 2: Dosierungen

Wirkstoff	Indikation	Dosierung	Anmerkung
Doxycyclin	bakterielle Infektionen der Atemwege	20 mg/kg alle 48 h	nach Antibiogramm
Fenbendazol	Magen-Darm-Parasiten	25–50 mg/kg	Wiederholung nach 10–14 Tagen
Marbofloxacin	bakterielle Infektionen	2 mg/kg alle 48 h	nach Antibiogramm
Meloxicam	Schmerztherapie	0,2 mg/kg 1 × tgl.	nach Kontrolle der Nierenwerte, Cave Magengeschwüre
Metronidazol	Flagellaten	20 mg/kg tgl. über 10 Tage	häufig schwer zu therapieren
Toltrazuril	Kokzidiose	20–25 mg/kg	Wiederholung nach 10–14 Tagen
Kalzium	Hypokalzämie	10–100 mg/kg	insbesondere bei Jungtieren genau dosieren, kann akutes Herzversagen auslösen
Oxytocin	Legenot	4 IE/kg	nicht wiederholen, falls ohne Erfolg, dann immer Indikation zu chirurgischem Vorgehen

Quelle: Ströse, Schütz, Schütz, Kempf (2013): Dosierungsvorschläge für Arzneimittel bei Vögeln, Reptilien, Amphibien und Fischen; MemoVet, Schattauer. Stuttgart